

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 4% -  
Solução com tensoativos**

Código: FT 065

Revisão: 00

Emissão: Julho/2019

### DESCRIÇÃO

Gliconato de Clorexidina 4% - Solução Degermante ou com tensoativos - é um antisséptico para degermação da pele. Seu ativo é uma biguanida catiônica, totalmente solúvel. Sua atividade ocorre mais lentamente que a dos álcoois, porém a redução da microbiota é mais eficaz que os iodóforos no mesmo tempo de aplicação. Age por destruição da membrana celular e precipitação dos componentes da bactéria. Excelente ação contra bactérias gram-positivas, boa atividade contra gram-negativas, fungos e vírus, porém mínima ação contra o bacilo da tuberculose.

Sinônimos Químicos e Comerciais: Gluconato de Clorexidina, Digluconato de Clorexidina, Clorexidina Degermante.

### INDICAÇÕES

Gliconato de Clorexidina 4% - Solução com tensoativos é um antisséptico tópico; indicado para degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos (p.ex., cirurgia, cateter venoso central); banho pré-operatório de pacientes; preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes e em situações de surto.

### CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina.

### ADVERTÊNCIAS

Evitar contatos com os olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Não usar para curativos. Não usar em mucosas.

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 4% -  
Solução com tensoativos**

Código: FT 065

Revisão: 00

Emissão: Julho/2019

### INSTRUÇÕES DE USO

Uso externo. Uso: Adulto e pediátrico, conforme orientação médica.

Aplicar o Gliconato de Clorexidina 4% - Solução com tensoativos, para antissepsia das mãos: seguir a técnica de preparo pré-operatório preconizada pela Anvisa e disponível para consulta em seu endereço eletrônico <[http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao\\_maos/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/index.htm)>.

ANTISSEPSIA DO CAMPO OPERATÓRIO: umedecer a pele e aplicar o produto friccionando suavemente. Enxaguar e secar a área com compressas estéreis.

BANHO PRÉ-OPERATÓRIO: umedecer o corpo e aplicar o produto. Com o auxílio das mãos ou esponjas, friccionar suavemente até obtenção de espuma. Enxaguar e secar.

### APRESENTAÇÕES

30 ml - Caixa contendo 24 frascos almotolias.

100 ml - Caixa contendo 24 frascos almotolias.

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos litro.

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos litro – Dispenser.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“Não ingerir.”

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”

“Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.”

“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.”

### COMPOSIÇÃO

Ativo: Gliconato de clorexidina 4 %.

Excipientes: Álcool etílico, glicerina, amina óxida, hidroxietilcelulose, essência, corante e água purificada.

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 4% -  
Solução com tensoativos**

Código: FT 065

Revisão: 00

Emissão: Julho/2019

**PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Cor da solução:..... Verde.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido viscoso com propriedades tensoativas.

pH:..... 5,5 a 7,0.

Viscosidade:..... 200 – 700 cP.

Densidade:..... 0,990 a 1,020 g/ml.

Teor de clorexidina:..... 3,80 a 4,20 %.

**PRAZO DE VALIDADE**

36 meses.

**CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO**

Conservar em temperatura ambiente. Manter o produto em sua embalagem original ao abrigo da luz e calor excessivo.

**DESCARTE**

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

**REGISTRO ANVISA**

“MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 de 2006. ”

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 1.03.382-8.