

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% -
Solução Alcoólica**

Código: FT 033

Revisão: 05

Emissão: Dezembro/2021

DESCRIÇÃO

Gliconato de Clorexidina 0,5% é um antisséptico, em solução alcoólica. Seu ativo é uma biguanida catiônica totalmente solúvel. Sua atividade ocorre mais lentamente que a dos álcoois, porém a redução da microbiota é mais eficaz que os iodóforos no mesmo tempo de aplicação. Age por destruição da membrana celular e precipitação dos componentes da bactéria. Excelente ação contra bactérias gram-positivas, boa atividade contra gram-negativas, fungos e vírus, porém mínima ação contra o bacilo da tuberculose.

Sinônimos Químicos e Comerciais: Gluconato de Clorexidina, Digluconato de Clorexidina, Digliconato de Clorexidina, Clorexidina Alcoólica.

INDICAÇÕES

Gliconato de Clorexidina 0,5% é um antisséptico tópico. Para antisepsia de pele antes de procedimentos invasivos e antisepsia do campo operatório após degermação; para realização de curativo de local de inserção de cateteres vasculares.

Uso: Adulto e pediátrico, conforme orientação médica.

CONTRAINDICAÇÕES

Pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina.

ADVERTÊNCIAS

Evitar contatos com os olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Não deve ser utilizada para irrigação da cavidade corpórea, curativo de ferida cirúrgica ou de lesões de pele e mucosa. Não utilizar em mucosas.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% -
Solução Alcoólica**

Código: FT 033

Revisão: 05

Emissão: Dezembro/2021

INSTRUÇÕES DE USO

Uso externo.

Aplicar o Gliconato de Clorexidina 0,5% - Solução Alcoólica em quantidade suficiente para umedecer toda a área a ser tratada, esfregando com gaze estéril. Deixar secar completamente e, se necessário, repetir o procedimento.

Aguarde o produto secar completamente antes de qualquer punção ou inserção na pele. Para antisepsia da pele em procedimentos cirúrgicos, realizar antes da degermação da pele com solução de clorexidina com tensoativo.

APRESENTAÇÕES

1000 ml – Caixa contendo 12 frascos litro

100 ml – Caixa contendo 24 almotolias.

30 ml – Caixa contendo 48 almotolias.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“Não ingerir.”

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”

“Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.”

“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.”

COMPOSIÇÃO

Gliconato de clorexidina..... 0,5 %

Excipientes: Álcool etílico, Glicerina, Propilenoglicol, Corante (CI 42090), Ácido cítrico, Essência e Água Deionizada.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% -
Solução Alcoólica**

Código: FT 033

Revisão: 05

Emissão: Dezembro/2021

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... Azul claro.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Solução alcoólica límpida e isenta de partículas.

pH:..... 5,5 a 7,0.

Densidade:..... 0,830 a 0,930 g/ml.

Teor de clorexidina:..... 0,47 a 0,60 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente. Manter o produto em sua embalagem original ao abrigo da luz e calor excessivo.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

“MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 de 2006.”

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 1.03.382-8.