

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% -
Solução alcoólica**

Código: FT 063

Revisão: 02

Emissão: Dezembro/2021

DESCRIÇÃO

Gliconato de Clorexidina 2% - Solução Alcoólica - é um antisséptico tópico. Seu princípio ativo é uma biguanida catiônica, totalmente solúvel. Sua atividade ocorre mais lentamente que a dos álcoois, porém a redução da microbiota é mais eficaz que os iodóforos no mesmo tempo de aplicação. Age por destruição da membrana celular e precipitação dos componentes da bactéria. Excelente ação contra bactérias gram-positivas, boa atividade contra gram-negativas, fungos e vírus, porém mínima ação contra o bacilo da tuberculose.

Sinônimos Químicos e Comerciais: Gliconato de Clorexidina, Digliconato de Clorexidina, Clorexidina Alcoólica.

INDICAÇÕES

Gliconato de Clorexidina 2% - Solução Alcoólica é um antisséptico tópico; indicado para a antisepsia do campo operatório; antisepsia da pele antes de procedimentos invasivos. Antissepsia no sítio de inserção de catéteres vasculares centrais e periféricos.

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina.

ADVERTÊNCIAS

Evitar contatos com os olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Não deve ser utilizada para irrigação de cavidade corpórea. Não usar para curativo da ferida cirúrgica ou de lesões de pele e mucosa.

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% -
Solução alcoólica**

Código: FT 063

Revisão: 02

Emissão: Dezembro/2021

INSTRUÇÕES DE USO

Uso externo. Uso adulto e pediátrico, conforme orientação médica.

Aplicar o Gliconato de Clorexidina 2% - Solução Alcoólica, em quantidade suficiente para umedecer toda a área a ser tratada, esfregando com gaze estéril. Deixar secar e, se necessário, repetir o procedimento. Aguarde o produto secar completamente antes de qualquer punção ou inserção na pele.

APRESENTAÇÕES

30 ml – Caixa contendo 48 almotolias.

100 ml – Caixa contendo 24 almotolias.

500 ml – Caixa contendo 12 frascos pump.

1000 ml – Caixa contendo 12 frascos litro.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“Não ingerir.”

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”

“Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.”

“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.”

COMPOSIÇÃO

Gliconato de clorexidina..... 2 %

Excipientes: Álcool etílico, glicerina e água purificada.

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% -
Solução alcoólica**

Código: FT 063

Revisão: 02

Emissão: Dezembro/2021

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... Incolor a levemente amarelado.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Solução alcoólica límpida.

pH:..... 5,5 a 7,5.

Densidade:..... 0,850 a 0,950 g/ml.

Teor de clorexidina:..... 1,80 a 2,20 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente. Manter o produto em sua embalagem original ao abrigo da luz e calor excessivo.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

“MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 de 2006.”

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 1.03.382-8.